

La rage

- Genre *Lyssavirus*, même genre que les *European bat lyssavirus* 1 et 2 (EBLV-1 et 2), virus de chauves-souris.
- Facilement inactivé par les détergents classiques.
- Zoonose.

Vaccination

- Vaccin de base où la rage est endémique, sinon vaccination optionnelle.
- Vaccin inactivé, éventuellement associé à d'autres valences inactivées ou atténuées.
- Une seule injection en primo-vaccination induit une protection immunitaire.
- Les chats ont une meilleure réponse vaccinale que les chiens. Plus de 97% ont un titre en anticorps > 0,5 UI/ml après la première vaccination, titre qui est corrélé avec une bonne protection.
- Protection croisée avec les autres Lyssavirus (EBLV-1 et EBLV-2, virus de chauves-souris).
- Chatons:
 - Vaccination à 12 - 16 semaines pour éviter l'interférence avec les anticorps maternels. Puis rappel de vaccination 1 an après.
- Protection de 3 ans avec certains vaccins, cependant certaines législations régionales ou nationales peuvent demander des rappels plus fréquents.
- Les chats asymptomatiques infectés par le FeLV peuvent être vaccinés mais la réponse immunitaire n'est pas optimale, ce qui nécessite des rappels tous les 6 mois.
- Les chats atteints d'une maladie chronique stable (diabète sucré ou hyperthyroïdie p.ex.) seront vaccinés de la même manière que les chats en bonne santé.